

ПАМЯТКА

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПРОЛЕЖНЕЙ

Уход за лежащими больными требует терпения, моральных и физических сил, а также материальных затрат. Часто человек оказывается прикованным к постели на недели, месяцы, а в пожилом возрасте нередко и на годы. В случае длительной болезни родственники должны организовать быт лежачего пациента, приобрести специализированные средства и приспособления, изучить способы и процедуры оказания помощи, а иногда доверить уход за родственником профессионалам в области паллиатива. При ненадлежащем уходе у пациента могут появиться различные осложнения, и наиболее часто – пролежни.

Пролежни – это изменения тканей язвенно-некротического и дистрофического характера.

Причины появления пролежней у малоподвижных и лежачих больных

Лежачие пациенты длительное время проводят в неподвижном состоянии. Именно неподвижность является главной причиной изменений в эпидермисе. Создается продолжительная нагрузка на определенные участки тела, из-за чего происходит нарушение трофики тканей. Сдавливаются кровеносные сосуды и мягкие ткани, нарушается снабжение кожи питательными веществами, после чего эпидермис начинает быстро отмирать. Как правило, пролежни проявляются в области крестца, копчика и сидалищных костей.

При этом, пролежни образуются постепенно и практически незаметно. Кожа бледнеет, после чего краснеет, возникает отечность, а еще через некоторое время поражение эпидермиса может распространиться на более глубокие ткани, порой затрагивая кости.

Возникновение пролежней связано не только с продолжительной неподвижностью и, как следствие, нарушением трофики, но и с неграмотным или недостаточным уходом. Пролежни могут возникнуть в результате трения при перемещении или переворачивании, а также в результате мацерации – размягчении кожи из-за постоянного контакта с влагой (потом, мочой, выделениями из ран).

Компания Эверс груп Рус много лет успешно производит изделия для ухода за ранами. Основываясь на многолетнем опыте, было принято решение о создании косметических и лечебных средств для домашнего и профессионального применения для пациентов, нуждающихся в особом уходе.


Профилактика – важнейший фактор в вопросе предотвращения образования пролежней

Основа профилактики – правильный уход за кожей.

Средства EVERS LIFE PRO для недопущения образования пролежней (или минимизации рисков их образования) в виде салфетки с пропиткой и лосьон-спрея применяются на начальных стадиях нахождения пациента в лежачем состоянии исключительно по неповрежденной коже и являются лечебными косметическими средствами.

Использование данных средств позволяет медицинскому персоналу получить необходимый временной интервал (не менее 5 суток) для подбора пациенту специального матраса с антипролежневыми свойствами или обеспечение ему достаточного времени нахождения в вертикальном положении. При необходимости Средства могут применяться в комбинации с антипролежневым матрасом на постоянной основе.

Салфетка для предотвращения образования пролежней
из нетканого материала с пропиткой.
Форма выпуска - туба № 90, размер одной салфетки - 13,5 x 17,5 см.



Лосьон-спрей удобно применять бесконтактно при помощи распыления. Форма выпуска - флакон объемом 250 мл.



Оба средства оказывают антисептическое, местнораздражающее и противовоспалительное действие на фоне снижения мацерации тканей. Незаменимы для быстрого и удобного очищения кожи без использования воды и моющих средств. Содержащиеся в составе раствора действующие компоненты стимулируют поддержание целостности тканей, оказывают смягчающее действие.

Мощные бактерицидные свойства позволяют применять средство для профилактики пролежней и опрелостей.

■ - **Салициловая кислота** снимает зуд, оказывает кератопластическое действие (размягчает кожные инфильтраты), что приводит к подсушиванию поверхностных тканей в зонах тела, склонных к пролежнеобразованию.

■ - **Хлорид алюминия** снимает активное поверхностное потоотделение, что обеспечивает стабильный уровень влажности поверхности тела и блокирует развитие раздражения за счет избыточного потоотделения.

Продукты **EVERS LIFE PRO** незаменимы в комплексном полноценном уходе за кожей пациентов с ограничениями двигательной активности и помогают повысить качество их жизни.

Рекомендации по применению средств **EVERS LIFE PRO**

- 1) Провести лежащему пациенту гигиенические процедуры с целью очищения кожных покровов
- 2) Обработать участки кожи, склонные к пролежнеобразованию (области крестца, копчика и седалищных костей), с помощью салфеток или распыления спрея.
- 3) Дать средству впитаться естественным образом (занимает несколько минут), не производить никаких дополнительных манипуляций.
- 4) Закрыть обработанные участки пациента бельем или одеждой, привести пациента в необходимое положение.
- 5) Повторять процедуру после каждой гигиенической обработки во избежание развития пролежневого процесса.



Своевременное и эффективное лечение – залог успешного решения проблемы пролежней

Иногда время, когда пролежни еще можно предотвратить, упущено, и поврежденных участков кожи избежать не удастся. Главной проблемой пролежней является риск заражения крови, поскольку через раны инфекция может легко попасть в организм, что особенно опасно при ослабленном иммунитете. В таком случае крайне важно оперативно начать лечение.

На помощь в борьбе с пролежнями на начальных стадиях (I и II) приходит **Гель для лечения пролежней «EVERSMED»**. Средство в тубе 50 гр в виде биологически активного хитозан-желатинового гидрогеля с иммобилизованными декспантенолом, лидокаином и хлоргексидином. Гель обеспечивает заживление поврежденных воспаленных участков кожи пациентов при I и 2 стадии пролежней. Создает условия для нормального течения процесса регенерации, повышает эластичность кожи и стимулирует кровообращение, восстанавливает функции капилляров и что очень важно, способствует снятию болевых ощущений, что значительно повышает уровень комфорта пациента. Гель обладает нейтральным запахом, не имеет цвета, быстро высыхает.



Рекомендации по применению Геля для лечения пролежней «EVERSMED»

- 1) Перед применением средства очистить поврежденный участок кожи от раневого отделяемого
- 2) Вскрыть тубу, нанести достаточное количества геля на поврежденный участок и легкими массирующими движениями распределить по коже, выступая за края примерно на 1 см
- 3) Закрепить обработанную поверхность при помощи повязки пластырного типа или фиксирующего бинта
- 4) Применять не менее 2 раз в день до полного восстановления кожи



Результат заживления
пролежня с применением
геля EVERSMED


Для более серьезных и обширных поражений кожи (II-IV стадии) может применяться высокоэффективное средство нового поколения для комплексного лечения пролежней - медицинское изделие **Хитокол®**.



Это высокопористое раневое покрытие в форме аэрогеля на базе биологически активных биополимеров природного происхождения: хитозана или хитозана и коллагена с иммобилизованными антимикробными препаратами, анестетиком и протеолитическим ферментом для местного лечения трудно заживающих гнойных ран различной этиологии.

Преимущества Хитокол®:

1. Работает как гемостатик, анестетик, проявляет противовоспалительные свойства.
2. Способен к биоадгезии при контакте с тканями организма и последующей биодеградации.
3. Безопасное природное нетоксичное средство, атравматичное, с высокой сорбционной способностью.
4. Не имеет возрастных ограничений.
5. Не требует частой (ежедневной) смены повязок по сравнению с аналогичными средствами для лечения ран, что позволяет сократить травматизацию пораженной области и минимизировать затраты на лечение.
6. Может в равной степени применяться как в стационаре, так и в домашних условиях.
7. Показатели результативности и эффективности лечения выше, чем при использовании стандартных методов лечения (мази, растворы).



Результат заживления инфицированной, длительно не заживающей раны спустя 1 месяц с начала применения раневых покрытий **Хитокол®**

Хитокол® выпускается в различных модификациях

С	- ХИТОЗАН - СЕРЕБРО	Хитокол-СХ, Хитокол-СХД, Хитокол-КСХ, Хитокол-КСХД предназначены для лечения кровотокающих поверхностных и глубоких гнойных, гнойно-некротических ран, флегмон, абсцессов, термических, химических, радиационных ожогов II-III* степеней, обморожений.
КС	- ХИТОЗАН - КОЛЛАГЕН - СЕРЕБРО	
ДА	- ХИТОЗАН - ДИОКСИДИН - АНИЛОКАИН	
КДА	- ХИТОЗАН - КОЛЛАГЕН - ДИОКСИДИН - АНИЛОКАИН	Хитокол-ДА и Хитокол-КДА предназначены для ускорения застывания очагов эрозии, язв и уменьшения вероятности их разрастания.
СХ	- ХИТОЗАН - СЕРЕБРО - ХИМОТРИПСИН	Хитокол-КС обладает высокой гемостатической и антибактериальной активностью. Останавливает кровотечения, помогает в заживлении ран и снятии воспаления.
КСХ	- ХИТОЗАН - КОЛЛАГЕН - СЕРЕБРО - ХИМОТРИПСИН	
СХД	- ХИТОЗАН - СЕРЕБРО - ХИМОТРИПСИН - ДИОКСИДИН	Хитозан – ускоряет процессы заживления ран, уменьшает воспаление и отек, служит проводником лекарственных препаратов в рану.
КСХД	- ХИТОЗАН - КОЛЛАГЕН - СЕРЕБРО - ХИМОТРИПСИН - ДИОКСИДИН	Коллаген – оказывает выраженное гемостатическое действие, повышает способность к регенерации тканей.

Диоксидин®, коллоидное серебро – обеспечивают антимикробное действие средства.

Анилокаин - обеспечивает обезболивающее действие средства.

Химотрипсин - обеспечивает разжижение экссудатов и гнойных масс гнойно-некротических ран.

Размер покрытия	5 см x 5 см	9 см x 9 см
Толщина покрытия	0,4 см	0,4 см

*В соответствии с классификацией ожогов согласно Клиническим рекомендациям – Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей – 2021-2022-2023 (17.01.2023) – Утверждены Минздравом РФ

Рекомендации по применению раневого покрытия Хитокол®:

1. Оценить состояние раны на предмет выраженных признаков воспаления окружающих тканей, наличия гнойных затеков и массивных участков некроза тканей.
2. Обильно промыть рану водным раствором антисептика либо физиологическим раствором.
3. При необходимости выполнить хирургическую обработку, удалить налет фибрина с раневой поверхности. При кровоточивости из раны удостовериться в отсутствии явных источников кровотечения, при их наличии выполнить гемостаз. Повышенная диффузная кровоточивость из раны не является препятствием для использования раневых покрытий Хитокол®.
4. Выбрать средство подходящего размера и модификации. При обильной экссудации использовать сразу два средства или более.
5. Вскрыть упаковку по указанным на ней меткам. При необходимости, провести моделирование покрытия стерильным инструментом.
6. Разместить средство на ране, чтобы оно выступало на 5-10 мм за края раны. Прижать и удерживать в таком состоянии в течение 2-3 минут.
7. Зафиксировать покрытие подходящими перевязочными средствами.
8. В зависимости от стадии раневого процесса и этиологии раны повторная перевязка производится через 2-4 суток.
9. Осуществлять своевременный контроль за раневым процессом под повязкой. С раневой поверхности удалять только промокшие участки средства и заменять их новыми. Прилипшие участки изделия оставлять на ране до полной эпителизации.
10. Перед удалением покрытия с раны рекомендуется ее увлажнить хлоргексидином или физраствором во избежание травматизации подлежащих тканей и устранения болевого эффекта у пациентов.



Повязка мазевая сетчатая стерильная с эссенциальными микроэлементами

Представляет собой атравматическую полиэфирную сетку, пропитанную лечебной мазевой смесью. Мазевая основа из меди (Cu) и цинка (Zn) является активной регенерирующей композицией, действие основано на купировании процесса пролиферации бактерий при полном сохранении гидролипидной пленки на поверхности поврежденной кожи.

Медь и цинк относятся к эссенциальным (жизненно необходимым) микроэлементам. Их синергетическая комбинация усиливает защитные и регенеративные свойства кожи.

Свойства повязки:

- 1.** В качестве носителя мазевой основы выбрана химически неактивная адсорбируемая полиэфирная сетка, которая медленно отдает мазь в рану, выполняет роль импланта для грануляционных процессов в ране.
- 2.** Моделируется на ране любой сложности, не прилипает к раневой поверхности, не создает дискомфорта и болевых ощущений при снятии и замене повязки.
- 3.** Обладает противомикробным действием.
- 4.** Создает оптимальную для заживления влажную среду.
- 5.** Способствует выходу экссудата и очищению раны, стимулирует ранозаживление.
- 6.** Мазевая основа предотвращает попадание в рану влаги, воздуха и микроорганизмов из внешней среды.





Варианты исполнения:


Наименование	Действующие вещества	Примечание
Повязка мазевая сетчатая стерильная Cu Zn	водный раствор сульфатов меди и цинка	Универсальная повязка для всех видов ран
Повязка мазевая сетчатая стерильная Cu Zn + Al	водный раствор сульфата меди, сульфата цинка, хлорида алюминия	Подходит для лечения пролежней с обильным выделением экссудата
Повязка мазевая сетчатая стерильная Cu Zn + Ag	водный раствор сульфата меди, сульфата цинка, нитрата серебра	Подходит для лечения пролежней со средним и слабым экссудатом на 1 стадии раневого процесса
Повязка мазевая сетчатая стерильная Cu Zn + Se	водный раствор сульфата меди, сульфата цинка, селенита натрия	Подходит для лечения пролежней 1, 2 стадии

Состав:

Сетка: ПЭ 100% (Полиэфир).

Мазевая основа: см варианты исполнения.

Размер повязки: 10 x 10 см




Результат заживления раны на 12 день с применением Повязки мазевой сетчатой EVERS MED

Фазы (стадии) раневого процесса развития пролежней и подбор соответствующего лечения

Кожа здоровая, без покраснений и нарушений целостности. Пролежней нет.

Средства EVERS LIFE PRO (салфетка или спрей)




Стадия I. Четко ограниченное покраснение неповрежденной кожи, не исчезающее после прекращения давления. Покраснение исчезает через несколько часов или дней после прекращения давления в зависимости от степени нарушения кровообращения.

Повязка мазевая сетчатая стерильная
Гель для лечения пролежней «EVERSMED»




Стадия II. Частичное поражение эпидермиса до дермы. Характеризуется поверхностной язвой, которая может проявляться клинически в форме ссадины, пузыря или неглубокого кратера.

Повязка мазевая сетчатая стерильная
Гель для лечения пролежней «EVERSMED»
Раневое покрытие Хитокол®-С, ДА



Стадия III. Повреждение всех слоев кожи (эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки), которое может достигать лежащей под кожей фасции, не затрагивая ее. Клинически пролежень проявляется как глубокая открытая язва с обнажением подлежащих тканей или без такового.

Хирургическая обработка +
Раневое покрытие Хитокол®-ДА, -КС, -КДА



Стадия IV. Поражение кожи на всю толщину с обширным некрозом тканей и повреждением мышц, сухожилий и костей. Часто наблюдается разрушение тканей и образование карманов.

Хирургическая обработка +
Раневое покрытие Хитокол®-СХД, -КСХД, -КДА

Салфетка для профилактики геморроя и ухода за аноректальной зоной.

В уходе за лежачими, маломобильными и пациентами с временными ограничениями физического здоровья, особенно страдающими геморроидальной болезнью, большое значение имеет правильный уход за аноректальной зоной.

Салфетка медицинская для профилактики геморроя ЭверсЛайф со специальной лечебной пропиткой на основе хитозана предназначена для бережного гигиенического ухода за поврежденной и чувствительной аноректальной зоной. Применение салфетки позволяет снимать болевой синдром, раздражение и воспаление, купировать кровотечение и способствовать заживлению трещин прямой кишки.



Активные компоненты:

Хитозан – натуральный биodeградируемый полисахарид, эффективно проникает через кожу и активизирует в месте нанесения защитные реакции организма, способствует улучшению процессов обмена веществ и кровоснабжения. Ускоряет процессы регенерации и ранозаживления, улучшает микроциркуляцию.

Аминокапроновая кислота – обеспечивает гемостатическое действие.

Лидокаин – снимает боль и зуд.

Хлоргексидин – обеззараживает.

Особенности применения:

- 1) Удерживать салфетку в предварительно очищенной аноректальной зоне в течение 20-30 секунд.
- 2) Не требует смывания.
- 3) Применяется до и после ректальных процедур.

Размер: 13 x 18 см

Форма выпуска: Салфетка в саше, 10 шт. в коробке

Группа компаний **Эверс груп Рус** планирует расширить ассортимент продуктов для ухода за лежачими пациентами, поскольку паллиативная помощь является социально значимым, актуальным и быстроразвивающимся направлением медицины.

Паллиативные отделения входят в состав большинства крупных лечебных учреждений России, также осуществляются патронажные проекты по оказанию помощи на дому. Широкое распространение получили специализированные пансионаты и социальные дома для пожилых и маломобильных людей.

В связи с этим мы считаем своей миссией поддержку данного направления и создания современных продуктов по высоким стандартам для повышения качества жизни людей в нашей стране.

*Материалы в буклете носят информационный характер и не являются прямым руководством к действию. Для подбора адекватной схемы лечения рекомендуем обратиться к специалисту.

**К компонентам изделий возможны индивидуальные аллергические реакции.

Где купить
продукцию



ГК "Эверс груп Рус"
Россия, 125493, Москва, ул. Флотская,
д. 5, кор. Б, офис 108
+7(499) 707-10-09
evers@evers.ru
www.evers.ru

**Evers
group
Rus**

Производитель инновационных
и традиционных медицинских
изделий